

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なき時読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起りやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください。
(1) はげしい腹痛又は吐き気・嘔吐のある人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 3歳未満の乳幼児
(4) 防虫剤（ナフタリン等）、殺そ剤（猫イラズ等）等の薬剤を誤って服用した人
（このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。）
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
駆虫薬、他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

日本薬局方 第2類医薬品

加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コザカイ・P」

20mL

瀉下剤（下剤）



製造販売元 小堀製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9

効能・効果

腸内容物の急速な排除（食あたり等）

用法・用量

大人（15歳以上）…… 1回20mL
 11歳以上～15歳未満…… 1回13mL
 7歳以上～11歳未満…… 1回10mL
 3歳以上～7歳未満…… 1回 6mL
 いずれも1日1回を限度として、そのまま又は水、牛乳などに浮かべて必要時服用する。
 （用法・用量に関連する注意）

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 就寝前の服用をさけてください。

成分及び分量

本品20mL中にヒマシ油19.8mL、ハッカ油0.1mL、オレンジ油0.1mLを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

〈小堀製薬お客様相談窓口〉

電話：03-3631-1495（代表）

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

開封口

日本薬局方 第2類医薬品

加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コザカイ・P」

20mL

瀉下剤（下剤）



製造販売元 小堀製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9