

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)

この外箱の説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

!**使用上の注意**

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 次の症状のある人  
　　はげしい目の痛み
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

**効能・効果**

結膜囊の洗浄・消毒

**用法・用量**

1%以下の濃度で用いる。

**〈用法・用量に関する注意〉**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (3) 洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄してください。
- (4) 混濁したものは使用しないでください。
- (5) 本剤は洗眼用にのみ使用し、本剤又は本剤で調製されたものを誤飲しないよう注意してください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診療を受けてください。
- (6) 長期間使用しないでください。

**【1%液の調製法】**

添付のスプーンすり切り1杯(2g)を温湯(約60℃)200mLに溶かし、放冷後ご使用ください。

〈上手な使い方：溶かした液を脱脂綿等に浸して、目の周りを拭うようにご使用ください。〉

使用期限 : 2017.08  
製造番号 : TH-19

**成 分**

本品1g中、日本薬局方 ホウ砂1gを含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)
- (4) 洗眼カップは他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931

〈小堺製薬お客様相談窓口〉

電話 : 03-3631-1495 (代表)

受付時間 : 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)



4 987371 122806



外箱



内袋:PE